

## Mammographie Indikationen

klinische Angaben	RI ja	RI nein	Bemerkungen
< 50 Jahre, asymptomatisch - auch nach OP eines benignen Tumors		<b>X</b>	(analoge zu SSK-Orientierungshilfe J1)
>50J <70J asymptomatisch - auch nach OP eines benignen Tumors		<b>X</b>	Screening (analoge zu SSK-Orientierungshilfe J2)
>70 J asymptomatisch	<b>X</b>		Risiko erhöht - Schädigung vernachlässigbar
Familiäre erhöhte Disposition	<b>X</b>		(analoge zu SSK-Orientierungshilfe J3) jedoch nur wenn: a) 1 Mammatumor bei Verwandten 1. oder 2. Grades b) 2 Mammatumore bei Verwandten 3. & 4. Grades c) Ovarialkarzinom bei Verwandten 1. Grades
Hochrisikopatienten	<b>X</b>		(analoge zu SSK-Orientierungshilfe J4)
jedes Alter: tastbarer Knoten, unklarer Tastbefund bzw. positiver Sonographiebefund	<b>X</b>		(analoge zu SSK-Orientierungshilfe J5 & J6 & J9)
Mastopathie		<b>X</b>	
Mastodynie bds		<b>X</b>	
zyklusabhängige beidseitige Beschwerden		<b>X</b>	
Mastodynie einseitig	<b>X</b>		(analoge zu SSK-Orientierungshilfe J5 & J6)
histologisch definierte Risikoläsionen	<b>X</b>		atyp. duktale Epithelhyperplasie, radiäre Narbe, Carcinoma lobulare in situ
Sekretion aus Mamille	<b>X</b>		(analoge zu SSK-Orientierungshilfe J8)
Z.n. Mamma-Op (gutartig)		<b>X</b>	ggf. 1 malige Kontrolle
Z.n. Mamma-Ca. OP (invasiv und noninvasiv)	<b>X</b>		(analoge zu SSK-Orientierungshilfe J10 & J11)
entzündliche Veränderungen Mastitis/Abszess	<b>X</b>		(analoge zu SSK-Orientierungshilfe J5 & J6)
analoge zu SSK-Orientierungshilfe J7 & J12 & J13	<b>X</b>		
Neu aufgetretene Veränderungen an der Mamille und/oder Haut	<b>X</b>		z.B. Mamillenretraktion, Apfelsinhaut, Plateaubildung, etc.